

# AquaVitaeSurgery

## POŽADAVKY NA PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PACIENTŮ

- ❖ Dospělý s negativní anamnézou do 40 – let: Vyšetření obvodního lékaře obsahující anamnesu, klinické vyšetření a dále FW, KO, jaterní testy, glykémie, Quick, APTT, CRP, souhrn diagnos a zhodnocení rizika vzhledem k plánovanému výkonu
  - nad 40 let stejně, doplní se EKG
  - nad 50 let doplní se EKG, RTG S+P, urea, kreatinin, ionty
  
- ❖ Dospělý nemocný nebo s pozitivní anamnesou (ICHS, DM, cévní onemocnění, ledviny, atd.): vyšetření provede internista nebo event. specialista dle typu choroby s následným interním vyšetřením a závěrem vzhledem k riziku plánovaného výkonu. Samozřejmostí je příslušné rozšíření anamnesy, klinického vyšetření a paraklinických testů dle nemoci /onemocnění srdce - echo, ergometrie, onem. plic - spirometrie, hypertense - ionty, onem. cév - sono, event cévní a angio atd./
  
- ❖ U léků na snížení srážlivosti krve nejméně 10 dní před operací neužívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou.
  
- ❖ Použití ostatních léků na snížení srážlivosti krve musí být upraveno s jednoznačným požadavkem normalizace srážlivosti krve.
  
- ❖ Nejméně tři týdny před plánovanou operací by nemělo proběhnout žádné akutní virové, nebo jiné onemocnění.
  
- ❖ Pacient jde v den přijetí na operaci (jednodenní operativa), je proto vhodné pacienta poučit, kdy má vysadit perorální antidiabetika. Poučit ho též, ať v den operace užívá antihypertenzíva, pokud neurčíte jinak.